# Manejo da Asma Grave e Técnica de Inalação: Corticoides Inalatórios e Broncodilatadores — Desprescrição Racional e Prevenção de Iatrogenia (Dia 0127)

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 23/06/2026

Análise clínica e farmacoterapêutica do Dr. Cristiano Ricardo sobre Manejo da Asma Grave e Técnica de Inalação: Corticoides Inalatórios e Broncodilatadores. Foco em Pneumologia & Terapia Inalatória e Cuidado Farmacêutico & Farmacoterapia: avaliação de prescrição, interpretação de exames laboratoriais (Pico de fluxo expiratório (PFE): 65% do previsto; Teste de Controle da Asma (ACT) = 11 (asma muito mal controlada); Exame oral com ausência de monilíase.), identificação do erro/risco potencial e c

Versão online e eventuais atualizações:
https://cristianoricardo.com/post/clinica-farmaceutica-dia-0127-manejo-da-asma-grave-e-tecnica-de-inalacao-corticoides-inalatorios-e-b

Pneumologia & Terapia Inalatória · Cuidado Farmacêutico & Farmacoterapia

Manejo da Asma Grave e Técnica de Inalação: Corticoides Inalatórios e Broncodilatadores — Caso Clínico #0127

Diretriz Pedagógica de Cuidado Farmacêutico · Dr. Cristiano Ricardo · Publicação de 23/06/2026

A presente lição clínica integra o programa diário de capacitação e prática farmacêutica avançada do Dr. Cristiano Ricardo.
Sob o tema Manejo da Asma Grave e Técnica de Inalação: Corticoides Inalatórios e Broncodilatadores, abordamos a tomada de decisão clínica à beira do leito hospitalar e no consultório, unindo o raciocínio fisiopatológico às evidências farmacológicas modernas e à legislação profissional vigente.

Enquadramento Regulatório & Deontologia: Esta conduta farmacêutica fundamenta-se na Diretrizes GINA (Global Initiative for Asthma) e GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), assegurando autonomia técnica, responsabilidade sanitária e prevenção ativa de iatrogenias medicamentosas.

## 1. Apresentação do Caso Clínico & Anamnese Farmacêutica

Perfil do Paciente e Admissão: Mulher de 35 anos atendida em consultório farmacêutico com queixa de crises frequentes de asma noturna, utilizando 3 frascos de Salbutamol aerossol

(SABA) por mês.

Prescrição Médica Auditada: Salbutamol 100 mcg spray: inalar 2 jatos sempre que tiver falta de ar; sem corticoide inalatório prescrito.

## 2. Interpretação Farmacêutica de Resultados Clínicos e Laboratoriais

O farmacêutico deve correlacionar imediatamente a farmacocinética dos medicamentos prescritos aos parâmetros bioquímicos e hematológicos do paciente:

• Achados Laboratoriais Críticos: Pico de fluxo expiratório (PFE): 65% do previsto; Teste de Controle da Asma (ACT) = 11 (asma muito mal controlada); Exame oral com ausência de monilíase.

• Risco Terapêutico Detectado na Prescrição: Tratamento de asma baseado apenas em beta-2 agonista de curta ação (SABA) é condenado pelas diretrizes mundiais da GINA devido ao aumento demonstrado de reatividade brônquica rebote e mortalidade cardiovascular por crise asmática fatal.

• Substâncias e Alvos Envolvidos: Formoterol + Budesonida (Estratégia SMART) vs SABA Isolado

## 3. Avaliação Crítica da Prescrição & Racional Fisiopatológico

O farmacêutico clínico é o educador por excelência no manejo de dispositivos inalatórios. Mais de 70% dos asmáticos falham na técnica correta (expiração prévia, vedação dos lábios, apneia pós-inalação por 10 segundos). Corrigir a técnica é mais eficaz que dobrar a dose da medicação.

## 4. Intervenção Farmacêutica Estruturada & Plano de Cuidado

Conduta Farmacêutica Adotada (Método SOAP / Dáder / PCNE):

O farmacêutico orientou a paciente e enviou parecer ao médico: introdução de terapia combinada Formoterol/Budesonida (6/200 mcg ou 6/400 mcg) em dispositivo de pó seco para uso de manutenção e alívio das crises (Estratégia MART/SMART). Treinamento prático da técnica inalatória e orientação mandatória de enxaguar a cavidade oral com água após o uso para prevenir candidíase orofaríngea e disfonia.

## 5. Perólas Clínicas e Recomendações para a Prática Diária

• Documentação em Prontuário: Registre formalmente toda intervenção farmacêutica utilizando a metodologia SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), resguardando a equipe e conferindo rastreabilidade sanitária.

© 2026 Cristiano Ricardo · cristianoricardo.com

• Comunicação Interprofissional Efetiva: Ao sugerir ajustes posológicos ao médico assistente, apresente o racional fisiopatológico, o risco toxicodinâmico documentado e a proposta alternativa concreta pronta para validação.

• Engajamento do Paciente (Teach-Back): Em ambiente ambulatorial, certifique-se de que o paciente ou cuidador compreendeu os horários, interações com alimentos e sinais precoces de alarme que exigem pronto-socorro.

Dr. Cristiano Ricardo

Farmacêutico Clínico e Hospitalar · Especialista em Farmacoterapia & Cuidado Farmacêutico