# Hipotireoidismo e Farmacocinética Absortiva da Levotiroxina Sódica — Conciliação Medicamentosa e Transição do Cuidado

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 22/07/2026

Hipotireoidismo e Farmacocinética Absortiva da Levotiroxina Sódica. Foco em Endocrinologia & Metabologia e Seguimento Farmacoterapêutico & Farmacoterapia: avaliação de prescrição, interpretação de exames laboratoriais (TSH: 14,8 mUI/L (alvo: 0,4 a 4,0 mUI/L); T4 livre: 0,6 ng/dL.), identificação do erro/risco potencial e conduta farmacêutica resolutiva baseada em Diretrizes SBD 2023-2024 e ADA Standards of Care in Diabetes, Reso

Versão online e eventuais atualizações:
https://cristianoricardo.com/post/clinica-farmaceutica-dia-0156-hipotireoidismo-e-farmacocinetica-absortiva-da-levotiroxina-sodica

Endocrinologia & Metabologia · Seguimento Farmacoterapêutico & Farmacoterapia

Hipotireoidismo e Farmacocinética Absortiva da Levotiroxina Sódica — Caso Clínico

Diretriz Pedagógica de Cuidado Farmacêutico · Dr. Cristiano Ricardo · Publicação de 22/07/2026

A presente lição clínica integra o programa diário de capacitação e prática farmacêutica avançada do Dr. Cristiano Ricardo.
Sob o tema Hipotireoidismo e Farmacocinética Absortiva da Levotiroxina Sódica, abordamos a tomada de decisão clínica à beira do leito hospitalar e no consultório, unindo o raciocínio fisiopatológico às evidências farmacológicas modernas e à legislação profissional vigente.

Enquadramento Regulatório & Deontologia: Esta conduta farmacêutica fundamenta-se na Diretrizes SBD 2023-2024 e ADA Standards of Care in Diabetes, Resolução CFF nº 586/2013, assegurando autonomia técnica, responsabilidade sanitária e prevenção ativa de iatrogenias medicamentosas.

## 1. Apresentação do Caso Clínico & Anamnese Farmacêutica

Perfil do Paciente e Admissão: Mulher de 46 anos com hipotireoidismo primário por tireoidite de Hashimoto queixando-se de cansaço extremo e sonolência, apesar do aumento sucessivo da dose de levotiroxina para 175 mcg/dia.

Prescrição Médica Auditada: Levotiroxina 175 mcg/dia tomada no café da manhã juntamente com Carbonato de Cálcio 500mg, Sulfato Ferroso 40mg e Omeprazol 20mg.

© 2026 Cristiano Ricardo · cristianoricardo.com

## 2. Interpretação Farmacêutica de Resultados Clínicos e Laboratoriais

O farmacêutico deve correlacionar imediatamente a farmacocinética dos medicamentos prescritos aos parâmetros bioquímicos e hematológicos do paciente:

• Achados Laboratoriais Críticos: TSH: 14,8 mUI/L (alvo: 0,4 a 4,0 mUI/L); T4 livre: 0,6 ng/dL.

• Risco Terapêutico Detectado na Prescrição: Quelação físico-química e redução da acidez gástrica: cátions divalentes e trivalentes (cálcio e ferro) formam complexos insolúveis não absorvíveis com a levotiroxina no lúmen gastrointestinal, enquanto o IBP reduz a dissolução do comprimido, provocando refratariedade terapêutica aparente.

• Substâncias e Alvos Envolvidos: Levotiroxina Sódica + Interações com Suplementos de Cálcio e Ferro

## 3. Avaliação Crítica da Prescrição & Racional Fisiopatológico

A refratariedade ao tratamento com levotiroxina quase sempre é um problema de má administração ou interação medicamentosa e não de resistência hormonal tireoidiana. O método de seguimento farmacoterapêutico Dáder desvenda essas falhas e evita toxicidade cardiovascular decorrente de sobredoses prescritas inadvertidamente.

## 4. Intervenção Farmacêutica Estruturada & Plano de Cuidado

Conduta Farmacêutica Adotada (Método SOAP / Dáder / PCNE):

Farmacêutico reorganizou o aprazamento medicamentoso: Levotiroxina deve ser ingerida em jejum absoluto com água, no mínimo 30 a 60 minutos antes da primeira refeição; afastar os suplementos de cálcio e ferro para no mínimo 4 horas após a levotiroxina (por exemplo, após o almoço ou jantar). Reavaliação de TSH em 6 a 8 semanas com expectativa de redução da dose de levotiroxina para níveis fisiológicos (100 a 112 mcg/dia).

## 5. Perólas Clínicas e Recomendações para a Prática Diária

• Documentação em Prontuário: Registre formalmente toda intervenção farmacêutica utilizando a metodologia SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), resguardando a equipe e conferindo rastreabilidade sanitária.

• Comunicação Interprofissional Efetiva: Ao sugerir ajustes posológicos ao médico assistente, apresente o racional fisiopatológico, o risco toxicodinâmico documentado e a proposta alternativa concreta pronta para validação.

© 2026 Cristiano Ricardo · cristianoricardo.com

• Engajamento do Paciente (Teach-Back): Em ambiente ambulatorial, certifique-se de que o paciente ou cuidador compreendeu os horários, interações com alimentos e sinais precoces de alarme que exigem pronto-socorro.

Dr. Cristiano Ricardo

Farmacêutico Clínico e Hospitalar · Especialista em Farmacoterapia & Cuidado Farmacêutico